



INFORMACION SOBRE LA ENCEFALITIS DEL NILO OESTE

La Operación Mosquito S.T.I.N.G. es una estrategia lanzada por el Ejecutivo del Condado, Andy Spano en respuesta al resurgimiento de la encefalitis del Nilo Oeste. Es un programa de seguimiento y control del mosquito en una temprana etapa para prevenir la enfermedad del virus del Nilo Oeste en residentes del Condado de Westchester.

¿Qué es La Encefalitis del Nilo Oeste?

La encefalitis del Nilo Oeste es una enfermedad viral que se transmite a través de un piquete de mosquito que haya sido infectado al alimentarse de un ave portadora del virus. La encefalitis del Nilo Oeste es una infección viral del cerebro que puede causar daños serios e incluso la muerte en personas mayores de 50 años de edad. El virus del Nilo Oeste no se transmite de persona a persona ni de ave a persona.

¿Cómo se Propaga La Encefalitis del Nilo Oeste?

La enfermedad se propaga a través del piquete de un mosquito infectado con el virus. Los mosquitos son activos tanto durante el día como en la tarde y en la noche.

¿Quién Está en Riesgo de Contraer La Encefalitis del Nilo Oeste?

Cualquier persona puede ser infectada con el virus a través de un piquete de mosquito, pero las personas mayores de 50, son más susceptibles a complicaciones serias del virus. 89 por ciento de los casos nuevos en el año 2000 ocurrieron en personas mayores de 50 años de edad.

¿Cuáles son los Síntomas de La Encefalitis del Nilo Oeste?

Los síntomas de la infección del virus del Nilo Oeste generalmente ocurren entre 5 y 15 días después de ser picado por un mosquito infectado. La mayoría de las personas que son infectadas no sienten ningún síntoma, aunque si pueden experimentar fiebre o dolor de cabeza, antes de recuperarse completamente. Infecciones más serias resultan en la encefalitis del Nilo Oeste con fiebre alta, dolor de cabeza, confusión, dolor muscular, debilidad, convulsiones, o parálisis. Y en los casos más serios, la infección puede resultar en coma, daño neurológico permanente o muerte.

¿Qué Puede Hacer para Reducir el Riesgo de los Piquetes de Mosquito?

- Use camisas de manga larga, pantalón largo y calcetines cuando esté al aire libre y use repelente en la piel que no esté cubierta.
- Use repelente de insectos que no contenga más de 30% de DEET, pero úselo con moderación y cautela. Productos que no contengan DEET pueden ser menos efectivos. (Se recomiendan productos con menos de 10% de DEET para los niños, pero productos con DEET no se deben usar para los infantes.) Lea cuidadosamente las instrucciones del envase y lave la piel rociada cuando ya no esté expuesto a los mosquitos.
- Vacíe el agua de todas las latas, botellas, llantas viejas, canales de desagüe del techo obstruidos, decoraciones del jardín y todo envase al aire libre, ya que los mosquitos ponen sus huevos en el agua estancada.
- Asegúrese de que los mosquiteros sellen completamente las ventanas y puertas para evitar que entren mosquitos en su casa o departamento.
- Residentes deben procurar drenar los sótanos inundados y otras áreas donde el agua se acumula. Drene o cubra apretadamente las piscinas cuando no estén en uso. Esto se refiere tanto a las piscinas de casa como las de clubs u otros lugares.

-over-

¿Existe Alguna Vacuna o Tratamiento para la Encefalitis del Nilo Oeste?

No existe ninguna vacuna y el tratamiento que existe, se dirige solo a aminorar los síntomas. Los antibióticos no son efectivos, ni hay algún tratamiento específico disponible.



Para mayor información, llame la Línea de Información del Virus del Nilo Oeste al (914) 813-5609 o el Departamento de Salud del Condado de Westchester al (914) 813-5000 o visite nuestro domicilio del internet en www.Westchestergov.com/health.